



- Ракот на грлото на матката се развива во грлото на матката на жената (влезот во матката од вагината).
- Речиси сите случаи на рак на грлото на матката (99%) се поврзани со инфекција со високоризични хумани папиломавируси (ХПВ), исклучително чест вирус кој се пренесува преку сексуален контакт.
- Иако повеќето инфекции со ХПВ се решаваат спонтано и не предизвикуваат никакви симптоми, постојаната инфекција може да предизвика рак на грлото на матката кај жените.
- Ракот на грлото на матката е четврти најчест карцином кај жените.
- Ефективните примарни (ХПВ вакцинација) и секундарните превентивни пристапи (скрининг и лекување на преканцерозни лезии) ќе ги спречат повеќето случаи на рак на грлото на матката.
- Кога се дијагностицира, ракот на грлото на матката е една од најуспешно излечливите форми на рак, доколку се открие рано и ефикасно се управува. Ракот дијагностициран во доцните фази, исто така, може да се контролира со соодветен третман и палијативна нега.
- Со сеопфатен пристап за превенција, преглед и лекување, ракот на грлото на матката може да се елиминира како јавно здравствен проблем во рок од една генерација!

СИМПТОМИ И ЗНАЦИ КОИ МОЖЕ ДА ПРЕДУПРЕДАТ НА РАК НА ГРЛО НА МАТКА:

- **НЕРЕГУЛАРНО ИЛИ ПОСТМЕНОПАУЗАЛНО КРВАРЕЊЕ;**
- **ЗГОЛЕМЕН/ПРОМЕНЕТ ВАГИНАЛЕН ИСЦЕДОК;**
- **ПОВЕЌЕ РАЗЛИЧНИ СИМПТОМИ МОЖАТ ДА СЕ ЈАВАТ ВО НАПРЕДЕН СТАДИУМ**